令和８年度　**病害虫発生予報**　第７号

令和８年１０月１５日
千葉県農林総合研究センター長

Ⅰ　向こう１か月間の予報

発生量及び発生時期は平年との比較で表す。予想発生量は「多」「やや多」「並」「やや少」「少」で表している。予報の根拠の（＋）は多発要因、（－）は少発要因であることを示す。また、【　】内の数値は左側が９月下旬～10 月上旬の発生予察調査のデータ、右側が平年値（過去 10 年の平均値）を示す。

なお、「並」とは平年値を中心にして 40%の度数に入る幅、「やや多」「やや少」は「並」の外側 20%の度数に入る幅、「多」「少」は上記３者の外側 10%の度数に入る幅である。

また、下表の病害虫を防除する場合は、「千葉県総合防除計画」の該当ページ（※）の「総合防除の内容」を参照するとともに、３ページの「２　個々の病害虫に関する防除上の注意事項」も参考とすること。

千葉県総合防除計画（令和６年３月版）

作物名	病害虫名	予想発生量	予報の根拠 （９月下旬～10 月上旬の発生予察結果及び気象予報等）	※
夏秋トマト	うどんこ病	やや多	発病株率：やや多【4.40%/0.64%】（＋） 気象予報：降水量並　日照時間並か多（＋）	30
	灰色かび病	多	発病株率：多【33.60%/1.41%】（＋） 気象予報：降水量並　日照時間並か多（－）	31
	黄化葉巻病	やや少	発病株率：やや少【0.70%/7.82%】（－） 成虫寄生株率（タバココナジラミ）：並【0.40%/14.88%】	31
	タバコ コナジラミ	並	成虫寄生株率（タバココナジラミ）：並【0.40%/14.88%】 成虫寄生株率（オンシツコナジラミ）： やや少【0.80%/17.95%】（－） 9月黄色粘着トラップ誘殺数：少【0.00 頭/606.34 頭】（－） 気象予報：気温高（＋）降水量並	33
	オンシツ コナジラミ	少		
	アザミウマ類	並	成幼虫寄生株率：並【0.40%/6.76%】 9月黄色粘着トラップ誘殺数:少【0.00 頭/20.11 頭】（－） 気象予報：気温高（＋）降水量並	32
冬キャベツ	黒腐病	多	本年４月発病度：やや多【0.33/0.10】（＋） 発病度：多【9.40/0.25】（＋） 気象予報：気温高（＋）降水量並	36

作物名	病害虫名	予想発生量	予報の根拠 （９月下旬～10 月上旬の発生予察結果及び気象予報等）	※
秋冬ネギ	黒斑病	やや少	発病度：やや少【0.30/2.91】（－） 気象予報：降水量並	33
	葉枯病	多	発病度：多【13.80/2.04】（＋） 気象予報：降水量並	－
	さび病	並	発病度：並【0.00/0.01】 気象予報：降水量並	34
	べと病	並	発病株率：並【0.00%/0.40%】 気象予報：降水量並　日照時間並か多（－）	34
	ネギアザミウマ	少	成幼虫寄生株率：少【0.00%/23.15%】（－） 気象予報：気温高（＋）降水量並	34
	ネギコガ	多	被害株率：多【12.00%/0.42%】（＋） 気象予報：降水量並	35
イチゴ	うどんこ病	多	発病株率：多【2.18%/0.35%】（＋） 気象予報：日照時間並か多（＋）	42
	炭そ病	やや多	発病株率：やや多【2.18%/0.63%】（＋） 気象予報：気温高（＋）日照時間並か多（＋）	43
	灰色かび病	多	発病株率：多【0.36%/0.00%】（＋） 気象予報：日照時間並か多（－）	43
	ハダニ類	やや少	寄生株率：やや少【1.45%/3.55%】（－） 気象予報：気温高（＋）日照時間並か多（＋）	45
温州ミカン	ミカンハダニ	やや多	成虫寄生葉率：やや多【4.20%/1.94%】（＋） 気象予報：気温高（＋）降水量並	28
	カメムシ類	多	９月フェロモントラップ誘殺数：多【17.44 頭/8.83 頭】（＋） 被害果率：並【0.00%/0.00%】 気象予報：気温高（＋）降水量並	28
ビワ	灰斑病	並	発病葉率：やや少【0.00%/1.73%】（－） 気象予報：気温高（＋）降水量並	－
カーネーション	アザミウマ類	並	被害株率：並【3.20%/9.87%】 気象予報：気温高（＋）降水量並	－
	ハダニ類	並	成虫寄生株率：やや少【0.00%/3.79%】（－） 気象予報：気温高（＋）降水量並	－

作物名	病害虫名	予想発生量	予報の根拠 （９月下旬～10 月上旬の発生予察結果及び気象予報等）	※
野菜・花き共通	コナガ	並	９月フェロモントラップ誘殺数：やや少【0.05 頭/0.45 頭】（－） 寄生幼虫蛹数（冬キャベツ）：並【0.00 頭/0.02 頭】 気象予報：気温高（＋）降水量並	45
	ハスモンヨトウ	やや少	９月フェロモントラップ誘殺数：少【9.71 頭/26.48 頭】（－） 被害株率　（秋冬ネギ）：やや多【0.40%/0.28%】（＋） 幼虫寄生株率（夏秋トマト）：並【0.00%/0.00%】 〃　（イチゴ）：やや少【0.36%/1.49%】（－） 〃　（カーネーション）：並【0.00%/0.32%】 気象予報：気温高（＋）降水量並	46
	シロイチモジヨトウ	やや多	９月フェロモントラップ誘殺数：やや多【7.45 頭/4.86 頭】（＋） 被害株率（秋冬ネギ）：並【1.20%/7.05%】 幼虫寄生株率（カーネーション）：並【0.00%/0.16%】 気象予報：気温高（＋）降水量並	46
	オオタバコガ	並	９月フェロモントラップ誘殺数：並【3.05 頭/4.04 頭】 幼虫寄生株率（カーネーション）：並【0.00%/0.02%】 気象予報：気温高（＋）降水量並	45

＊　フェロモントラップ誘殺数：１日当たりの誘殺数

１　防除に関する措置（共通）

（１）病害虫は早期発見に努め、発生初期から薬剤防除する。
（２）発病株及び罹病部位は、ほ場外へ持ち出し適切に処分する。
（３）害虫の薬剤抵抗性の発達や耐性菌の発生を防ぐため、同系統薬剤の連用は避け、ローテーション散布を行う。
（４）病害虫の発生を予防するため、温湿度管理、防虫網の設置、周辺雑草の除草、輪作や緑肥作物の栽培等の耕種的防除及び物理的防除に努める。

２　個々の病害虫に関する防除上の注意事項

（１）灰色かび病（夏秋トマト）
　令和８年度 病害虫発生予察注意報第３号「トマト灰色かび病の多発生に注意」を参照する。

（２）うどんこ病（夏秋トマト）
　令和８年版農作物病害虫雑草防除指針（トマト・ミニトマト-２）を参照する。

（３）黒腐病（冬キャベツ）
　令和６年度病害虫発生情報第２号「キャベツ黒腐病の発生状況について」も参照する。

（４）葉枯病（秋冬ネギ）

令和８年版農作物病害虫雑草防除指針（ねぎ・わけねぎ-３）を参照する。

（５）ネギコガ（秋冬ネギ）

令和８年版農作物病害虫雑草防除指針（ねぎ・わけねぎ-５）を参照する。

（６）うどんこ病（イチゴ）

令和８年版農作物病害虫雑草防除指針（いちご-２）を参照する。

（７）炭そ病（イチゴ）

令和８年版農作物病害虫雑草防除指針（いちご-３）を参照する。

（８）灰色かび病（イチゴ）

令和８年版農作物病害虫雑草防除指針（いちご-３）を参照する。

（９）ミカンハダニ（温州ミカン）

令和８年版農作物病害虫雑草防除指針（温州みかん-１～３）を参照する。

（10）カメムシ類（温州ミカン）

令和８年版農作物病害虫雑草防除指針（温州みかん-１～３）を参照する。

（11）シロイチモジヨトウ（野菜・花き共通）

令和８年度病害虫発生予察注意報第２号「シロイチモジヨトウの多発生に注意」も参照する。

○主要病害虫の発生状況

巡回調査結果（イネ：８月中下旬、果樹・花き：９月下旬、サツマイモ・野菜：９月下旬～１０月上旬）

作物名（調査地域）	病害虫名	調査項目	調査結果			備考
			本年値	平年値	前年値	
イネ	斑点米	発生粒率（%）	0.20	0.31	0.31	1.7㎜でふるい掛けした玄米で調査
	黒点米(黒点症状米を含む)	発生粒率（%）	0.03	0.05	0.11	
	その他着色粒	発生粒率（%）	0.30	0.23	0.30	
サツマイモ（印旛、香取）	ハスモンヨトウ	100葉あたり寄生幼虫数	0.00	0.93	0.00	
	ナカジロシタバ	100葉あたり寄生幼虫数	0.00	0.36	0.00	
	イモキバガ	被害葉率（%）	0.00	1.15	0.00	
夏秋トマト（山武、印旛）	うどんこ病	発病株率（%）	4.40	0.64	0.00	
	灰色かび病	発病株率（%）	33.60	1.41	0.00	
		発病果率（%）	0.21	0.00	0.00	
		果実発病度	0.40	0.02	0.00	
	すすかび病	発病株率（%）	19.60	34.70	29.20	
	黄化葉巻病	発病株率（%）	0.70	7.82	8.50	
	オンシツコナジラミ	成虫寄生株率（%）	0.80	17.95	3.60	
	タバココナジラミ	成虫寄生株率（%）	0.40	14.88	14.40	
	ハスモンヨトウ	幼虫寄生株率（%）	0.00	0.00	0.00	
	ハモグリバエ類	幼虫寄生株率（%）	0.00	1.84	0.00	
	アザミウマ類	成幼虫寄生株率（%）	0.40	6.76	0.00	
	コナジラミ類	黄色粘着トラップ誘殺数	0.00	606.34	67.80	
	アザミウマ類	黄色粘着トラップ誘殺数	0.00	20.11	2.06	
冬キャベツ（海匝）	黒腐病	発病度	9.40	0.25	0.00	
	コナガ	10株当たり寄生幼虫蛹数	0.00	0.02	0.16	
	ハスモンヨトウ	幼虫寄生株率（%）	0.00	0.16	1.60	
秋冬ネギ（山武、長生）	黒斑病	発病度	0.30	2.91	0.60	
	葉枯病	発病度	13.80	2.04	1.40	
	さび病	発病度	0.00	0.01	0.00	
	べと病	発病株率（%）	0.00	0.40	0.00	
	ネギアザミウマ	被害度	11,60	21.01	19.00	
		成幼虫寄生株率（%）	0.00	23.15	16.40	
	ハスモンヨトウ	被害株率（%）	0.40	0.28	0.00	
	シロイチモジヨトウ	被害株率（%）	1.20	7.05	17.20	
	ネギコガ	被害株率（%）	12.00	0.42	0.00	
	ネギハモグリバエ	被害度	1.10	10.48	3.40	
イチゴ（山武、海匝、安房）	うどんこ病	発病株率（%）	2.18	0.35	0.00	
	炭そ病	発病株率（%）	2.18	0.63	0.00	
	灰色かび病	発病株率（%）	0.36	0.00	0.00	
	アブラムシ類	成幼虫寄生株率（%）	0.36	2.00	3.20	
	ハスモンヨトウ	幼虫寄生株率（%）	0.36	1.49	2.67	
	ハダニ類	寄生株率（%）	1.45	3.55	0.00	
ナシ（県内全域）	黒星病	発病葉率（%）	0.00	0.32	0.18	
	炭疽病	発病新梢率（%）	0.06	0.17	0.30	
	ハマキムシ類	被害葉率（%）	0.00	0.03	0.00	
	ハダニ類	成虫寄生葉率（%）	0.15	0.97	1.06	
	アブラムシ類	成幼虫寄生新梢率（%）	0.24	0.16	0.00	
温州ミカン（安房）	そうか病	果実発病度	0.00	0.16	0.04	
	かいよう病	果実発病度	0.00	0.00	0.00	
	黒点病	果実発病度	0.00	0.73	0.00	
	ヤノネカイガラムシ	成幼虫寄生果率（%）	0.00	0.02	0.00	
	ミカンハダニ	成虫寄生葉率（%）	4.20	1.94	0.00	
	アブラムシ類	成幼虫寄生新梢率（%）	0.00	0.96	3.80	
	ミカンハモグリガ	幼虫寄生葉率（%）	0.00	0.54	0.00	
	カメムシ類	被害果率（%）	0.00	0.02	0.00	
		払落虫数	0.00	0.92	0.00	
ビワ（安房）	灰斑病	発病葉率（%）	0.00	1.73	0.25	
	アブラムシ類	成幼虫寄生葉率（%）	0.00	0.00	0.00	
	カミキリムシ類	被害穴数	0.00	0.10	0.00	
カーネーション（安房）	萎凋症	発病株率（%）	0.80	0.40	0.00	
	立枯病	発病株率（%）	0.00	0.48	0.80	
	アザミウマ類	被害株率（%）	3.20	9.87	6.40	
	ナミハダニ	成虫寄生株率（%）	0.00	3.79	0.00	
	オオタバコガ	幼虫寄生株率（%）	0.00	0.02	0.00	
	シロイチモジヨトウ	幼虫寄生株率（%）	0.00	0.16	0.80	
	ハスモンヨトウ	成虫寄生株率（%）	0.00	0.32	0.00	
	その他ヨトウムシ類	幼虫寄生株率（%）	0.00	2.05	0.00	

トラップ月間誘殺数（９月）

区分	調査害虫名	トラップ設置場所	誘殺数			備　考
			本年値	平年値	前年値	
水稲予察灯		千葉	8.0	8.9	44.0	頭/月
	ニカメイガ	香取	8.3	4.5	3.0	
		安房	26.0	6.4	23.0	
		千葉	0.0	70.5	19.0	
	イネクロカメムシ	香取	6.2	16.0	22.0	
		安房	69.0	127.7	395.0	
		千葉	0.0	10.5	2.0	
	クモヘリカメムシ	香取	0.0	4.5	1.0	
		安房	151.0	5.4	14.0	
		千葉	0.0	0.3	0.0	
	ホソハリカメムシ	香取	0.0	0.5	0.0	
		安房	0.0	0.1	1.0	
		千葉	0.0	－	0.0	
	シラホシカメムシ類	香取	0.0	－	0.0	
		安房	0.0	－	0.0	
		千葉	14.0	27.1	46.0	
	イネカメムシ	香取	6.2	32.5	86.0	
		安房	12.0	5.9	8.0	
		千葉	10.0	46.1	54.0	
	ミナミアオカメムシ	香取	5.2	1.3	6.0	
		安房	713.0	58.3	95.0	
		千葉	0.0	3.1	0.0	
	アカヒゲホソミドリカスミカメ	香取	1.0	1.0	3.0	
		安房	6.0	4.7	1.0	
		千葉	7.0	56.6	30.0	
	アカスジカスミカメ	香取	3.1	3.0	4.0	
		安房	43.0	48.4	20.0	
性フェロモン	ドウガネブイブイ	印旛、香取	1.78	2.78	3.15	頭/日
	ヒメコガネ	印旛、香取	0.25	0.64	0.06	
	コナガ	海匝、安房	0.05	0.45	0.11	
	ハスモンヨトウ	県内全域	9.71	26.48	30.24	
	シロイチモジヨトウ	県内全域	7.45	4.86	14.04	
	オオタバコガ	県内全域	3.05	4.04	5.61	
	タバコガ	県内全域	1.13	1.51	2.06	
	ナシヒメシンクイ	東葛飾、印旛	3.58	2.83	2.17	
	モモシンクイガ	東葛飾、印旛	0.01	0.01	0.00	
	チャハマキ	東葛飾、印旛	0.68	0.43	0.12	
	チャノコカクモンハマキ	東葛飾、印旛	2.33	1.11	1.36	
チャバネアオカメムシ集合フェロモン	チャバネアオカメムシ	県内全域	16.05	6.78	6.01	頭/日
	ツヤアオカメムシ	〃	0.80	1.44	3.23	
	クサギカメムシ	〃	0.60	0.61	0.37	
	マルボシヒラタヤドリバエ（天敵）	〃	0.29	0.41	0.14	

○気象予報


１０月８日気象庁発表
関東甲信地方における向こう１か月間の確率（%）

要　　素	低い・少ない	平年並	高い・多い
気　　温	10	20	70
降 水 量	40	30	30
日照時間	20	40	40

出典：気象庁ホームページ

向こう１か月間の各気象要素の平年値
（10月10日～11月9日）

要　　素	千葉	銚子	館山
気　　温（℃）	17.1	17.8	17.1
降 水 量（mm）	169.2	215.4	215.3
日照時間（hr）	140.2	143.2	144.8



過去２か月の気象概況（アメダス千葉、銚子地方気象台提供）

農薬は適正に使用しましょう。無登録農薬の使用はできません。

- 農薬は、農薬取締法に基づいて、使用できる農作物の種類、適用病害虫、希釈倍数、収穫前日数、総使用回数などが定められています。
- 登録番号のない薬剤は、農薬として使用できません。登録農薬には必ず登録番号が記載されています（記載例　農林水産省登録第〇〇〇号）。
- 農薬はラベルをよく読んで適正に使用しましょう。
- 飛散しないよう工夫して散布しましょう。
- 農薬を使用したら必ず記帳するようにしましょう。
- タンクやホースは洗いもれがないようきれいに洗っておきましょう。

・病害虫発生予察情報はインターネットでもご覧いただけます。
　メールの配信サービスも実施しています（要事前登録）
　　https://www.pref.chiba.lg.jp/lab-nourin/nourin/boujo/

・次回の発行予定は令和８年１１月１３日です。
　なお、注意報等の臨時情報は逐次発行されます。

・県内で栽培される主要な農作物に発生する病害虫や雑草を
　防除するための指針が千葉県 HP で公開されています。
　　https://www.pref.chiba.lg.jp/annou/shokubo/bojoshishin.html

・薬剤の選定については、最新の農薬登録情報を確認してください。
　　https://pesticide.maff.go.jp/

問合せ先
千葉県農林総合研究センター病害虫防除課
〒266-0014　千葉市緑区大金沢町 180 番地 1
TEL 043(291)6077　FAX 043(226)9107
E-mail cafrc-bojo@mz.pref.chiba.lg.jp