令和８年度　病害虫発生予報　第６号

令 和 ８ 年 ９ 月 １ ５ 日
千葉県農林総合研究センター長

発生量及び発生時期は平年との比較で表す。予想発生量は「多」「やや多」「並」「やや少」「少」で表している。予報の根拠の（＋）は多発要因、（－）は少発要因であることを示す。また、【　】内の数値は左側が８月下旬～９月上旬の発生予察調査のデータ、右側が平年値（過去10年の平均値）を示す。

なお、「並」とは平年値を中心にして40%の度数に入る幅、「やや多」「やや少」は「並」の外側20%の度数に入る幅、「多」「少」は上記３者の外側10%の度数に入る幅である。

また、下表の病害虫を防除する場合は、「千葉県総合防除計画」の該当ページ（※）の「総合防除の内容」を参照するとともに、３ページの「２　個々の病害虫に関する防除上の注意事項」も参考とすること。

千葉県総合防除計画（令和６年３月版）

作物名	病害虫名	予想発生量	予報の根拠（８月下旬～９月上旬の発生予察結果及び気象予報等）	※
サツマイモ	ナカジロシタバ	並	寄生幼虫数：並【1.00頭/0.68頭】 気象予報：気温高（＋）降水量並か多（－）	22
	イモキバガ	やや少	寄生幼虫数：やや少【0.00頭/0.92頭】（－） 被害葉率：少【0.80%/5.70%】（－） 気象予報：気温高（＋）降水量並か多（－）	－
夏秋トマト	すすかび病	やや多	発病株率：やや多【14.40%/8.10%】（＋） 気象予報：降水量並か多（＋）　日照時間並	31
	灰色かび病	多	発病株率：多【4.00%/0.18%】（＋） 気象予報：降水量並か多（＋）日照時間並	31
	アザミウマ類	やや少	成幼虫寄生株率：やや少【0.00%/4.17%】（－） 気象予報：降水量並か多（－）日照時間並	32
	黄化葉巻病	やや少	発病株率：やや少【0.70%/3.19%】（－） タバココナジラミ成虫寄生株率：並【1.20%/9.90%】	31
	タバココナジラミ	並	成虫寄生株率：並【1.20%/9.90%】 気象予報：降水量並か多（－）日照時間並	33
	オンシツコナジラミ	少	成虫寄生株率：少【0.00%/9.23%】（－） 気象予報：降水量並か多（－）日照時間並	33

作物名	病害虫名	予想発生量	予報の根拠 （８月下旬～９月上旬の発生予察結果及び気象予報等）	※
秋冬ネギ	ネギアザミウマ	やや多	被害度：多【39.20%/24.37%】（＋） 成幼虫寄生株率：並【29.60%/30.02%】 気象予報：気温高（＋）降水量並か多（－）	34
	ネギコガ	多	被害株率：多【2.00/0.24】（＋） 気象予報：気温高（＋）降水量並か多（－）	35
野菜・花き共通	コナガ	やや少	８月フェロモントラップ誘殺数：やや少【0.09頭/0.28頭】（－） 気象予報：気温高（＋）降水量並か多（－）	45
	ハスモンヨトウ	やや少	８月フェロモントラップ誘殺数：少【5.15頭/12.79頭】（－） 100葉当たり寄生幼虫数（サツマイモ） ：多【1.20頭/0.16頭】（＋） 幼虫寄生株率(サトイモ)：やや多【23.73%/11.04%】（＋） 〃　（夏秋トマト）：並【0.00%/0.04%】 被害株率　（秋冬ネギ）：並【0.00%/0.04%】 気象予報：気温高（＋）降水量並か多（－）	46
	シロイチモジヨトウ	多	８月フェロモントラップ誘殺数 ：やや多【6.20頭/2.81頭】（＋） 被害株率（秋冬ネギ）：やや多【3.20%/2.76%】（＋） 気象予報：気温高（＋）降水量並か多（－）	46
	タバコガ類	並	８月フェロモントラップ誘殺数 オオタバコガ：並【2.95頭/3.05頭】 タバコガ　：並【1.02頭/1.26頭】 幼虫寄生株率（夏秋トマト） ：やや少【0.00%/0.24%】（－） 気象予報：気温高（＋）降水量並か多（－）	45
温州ミカン	ミカンハダニ	並	成虫寄生葉率：並【3.60%/3.97%】 気象予報：気温高（＋）降水量並か多（－）	28
	カメムシ類	並	８月フェロモントラップ誘殺数：並【8.87頭/7.31頭】 被害果率：並【0.00%/0.00%】 気象予報：気温高（＋）降水量並か多（－）	28

＊　フェロモントラップ誘殺数：１日当たりの誘殺数

１　防除に関する措置（共通）

（１）病害虫は早期発見に努め、発生初期から薬剤防除する。

（２）発病株及び罹病部位は、ほ場外へ持ち出し適切に処分する。

（３）害虫の薬剤抵抗性の発達や耐性菌の発生を防ぐため、同系統薬剤の連用は避け、ローテーション散布を行う。

（４）病害虫の発生を予防するため、温湿度管理、防虫網の設置、周辺雑草の除草、輪作や緑肥作物の栽培等の耕種的防除及び物理的防除に努める。

２　個々の病害虫に関する防除上の注意事項

（１）すすかび病（夏秋トマト）

令和８年版農作物病害虫雑草防除指針（トマト・ミニトマト－３）を参照する

（２）灰色かび病（夏秋トマト）

令和７年度病害虫発生情報第６号「トマト灰色かび病の多発生に注意」を参照する。

（３）ネギアザミウマ（秋冬ネギ）

多発ほ場では、防除効果の持続性が期待できる粒剤の土壌施用と併せて、乾燥時にも即効性が期待できる茎葉散布剤の地上部散布により、薬剤防除する。令和８年版農作物病害虫雑草防除指針（ねぎ・わけねぎ－４）を参照して、早期防除を実施する。

（４）ネギコガ（秋冬ネギ）

令和８年版農作物病害虫雑草防除指針（ねぎ・わけねぎ－５）も参照する。

（５）シロイチモジヨトウ（野菜・花き共通）

令和８年度病害虫発生予察注意報第２号「シロイチモジヨトウの多発生に注意」を参照する。

参考資料

○主要病害虫の発生状況

巡回調査結果（水稲・果樹・夏秋トマト：８月下旬、サツマイモ・ラッカセイ・秋冬ネギ・サトイモ：９月上旬）

作物名（調査地域）	病害虫名	調査項目	調査結果			備考
			本年値	平年値	前年値	
イネ（県内全域）	いもち病(穂いもち)	発病穂率（%）	0.24	0.07	0.07	
	紋枯病	発病度	3.63	2.95	3.60	
	縞葉枯病	発病株率（%）	0.91	0.96	1.12	
	ごま葉枯病	発病株率（%）	17.71	14.82	24.76	
	稲こうじ病	発病株率（%）	0.06	0.24	0.00	
	イネクロカメムシ	25 株当たり寄生成幼虫数	1.87	0.48	1.22	
	ニカメイガ	被害株率（%）	0.46	0.16	0.94	
	イチモンジセセリ	25 株当たり被害苞数	0.00	0.00	0.00	
	コブノメイガ	上位２葉被害株率（%）	0.00	0.10	0.00	
	セジロウンカ	20回振りすくい取り捕獲成幼虫数	0.94	2.25	0.38	
	トビイロウンカ	20回振りすくい取り捕獲成幼虫数	0.00	0.00	0.00	
	ヒメトビウンカ	20回振りすくい取り捕獲成幼虫数	74.16	36.03	59.84	
	ツマグロヨコバイ	20回振りすくい取り捕獲成幼虫数	91.46	106.82	52.44	
	クモヘリカメムシ	20回振りすくい取り捕獲成幼虫数	0.51	1.00	1.29	
	ホソハリカメムシ	20回振りすくい取り捕獲成幼虫数	0.27	0.28	1.00	
	イネカメムシ	20回振りすくい取り捕獲成幼虫数	0.16	0.34	0.46	
	シラホシカメムシ類	20回振りすくい取り捕獲成幼虫数	0.01	0.06	0.04	
	ミナミアオカメムシ	20回振りすくい取り捕獲成幼虫数	0.20	0.04	0.13	
	アカヒゲホソミドリカスミカメ	20回振りすくい取り捕獲成幼虫数	0.13	0.02	0.01	
	アカスジカスミカメ	20回振りすくい取り捕獲成幼虫数	1.06	0.55	0.32	
サツマイモ（印旛、香取）	ハスモンヨトウ	100葉当たり寄生幼虫数	1.20	0.16	0.20	
	ナカジロシタバ	100葉当たり寄生幼虫数	1.00	0.68	1.40	
	イモキバガ	100葉当たり寄生幼虫数	0.00	0.92	0.60	
		被害葉率（%）	0.80	5.70	2.00	
ラッカセイ（千葉、印旛、君津）	そうか病	発病度	0.00	0.01	0.00	
	褐斑病	発病度	25.40	23.62	16.11	
	黒渋病	発病度	0.00	0.31	0.11	
	白絹病	発病株率（%）	0.40	2.74	2.89	
夏秋トマト（印旛、山武）	灰色かび病	発病株率（%）	4.00	0.18	0.00	
		発病果率（%）	0.00	0.00	0.00	
		果実発病度	0.00	0.00	0.00	
	すすかび病	発病株率（%）	14.40	8.10	2.00	
	黄化葉巻病	発病株率（%）	0.70	3.19	3.30	
	アブラムシ類	成幼虫寄生株率（%）	0.00	0.04	0.00	
	タバコガ類	幼虫寄生株率（%）	0.00	0.24	0.00	
	オンシツコナジラミ	成虫寄生株率（%）	0.00	9.23	4.00	
	タバココナジラミ	成虫寄生株率（%）	1.20	9.90	6.40	
	ハスモンヨトウ	幼虫寄生株率（%）	0.00	0.04	0.00	
	ハモグリバエ類	幼虫寄生株率（%）	0.00	0.87	0.40	
	アザミウマ類	成幼虫寄生株率（%）	0.00	4.17	0.00	
秋冬ネギ（山武、長生）	黒斑病	発病度	0.00	1.14	0.00	
	葉枯病	発病度	0.60	0.74	0.60	
	さび病	発病度	0.00	0.00	0.00	
	べと病	発病株率（%）	0.00	0.04	0.00	
	ネギアザミウマ	被害度	39.20	24.37	24.20	
		成幼虫寄生株率（%）	29.60	30.02	23.60	
	ハスモンヨトウ	被害株率（%）	0.00	0.04	0.00	
	シロイチモジヨトウ	被害株率（%）	3.20	2.76	9.60	
	ネギコガ	被害株率（%）	2.00	0.24	0.00	
	ネギハモグリバエ	被害度	2.70	6.50	1.50	
サトイモ（山武、印旛、君津）	疫病	発生程度	14.87	16.68	1.79	
	汚斑病	発病葉率（%）	15.20	13.44	12.53	
	ワタアブラムシ	成幼虫寄生程度	19.20	11.44	6.76	
	ハスモンヨトウ	幼虫寄生株率（%）	23.73	11.04	22.61	
	カンザワハダニ	成虫寄生程度	3.60	10.56	10.53	
ナシ（県内全域）	黒星病	発病葉率（%）	0.15	0.49	0.12	
	ハマキムシ類	被害葉率（%）	0.00	0.06	0.00	
	ハダニ類	成虫寄生葉率（%）	4.36	2.09	1.33	
	アブラムシ類	成幼虫寄生新梢率（%）	0.24	0.27	0.45	
	吸ガ類	被害果率（%）	0.00	0.09	0.07	
	カメムシ類	被害果率（%）	0.00	0.28	0.36	

作物名（調査地域）	病害虫名	調査項目	調査結果			備考
			本年値	平年値	前年値	
温州ミカン（安房）	そうか病	果実発病度	0.04	0.17	0.28	
	かいよう病	果実発病度	0.00	0.00	0.00	
	黒点病	果実発病度	0.00	0.09	0.00	
	カメムシ類	被害果率（%）	0.00	0.00	0.00	
	ヤノネカイガラムシ	成幼虫寄生葉率（%）	0.00	0.00	0.00	
	ミカンハダニ	成虫寄生葉率（%）	3.60	3.97	1.60	
	アブラムシ類	成幼虫寄生新梢率（%）	0.00	0.44	0.00	
	ミカンハモグリガ	幼虫寄生葉率（%）	0.00	0.31	0.20	

トラップ月間誘殺数（８月）＊種類別の単位の違いに注意

区分	調査害虫名	トラップ設置場所	誘殺数			備　考
			本年値	平年値	前年値	
水稲予察灯	ニカメイガ	千葉	40.3	27.7	200.3	頭/月
		香取	68.7	18.4	18.4	
		安房	22.3	17.5	147.1	
	イネクロカメムシ	千葉	2.1	175.0	49.4	
		香取	31.9	14.2	38.7	
		安房	782.9	123.8	205.2	
	クモヘリカメムシ	千葉	15.5	23.2	16.5	
		香取	5.8	12.2	12.6	
		安房	68.7	38.9	25.2	
	ホソハリカメムシ	千葉	0.0	0.9	1.0	
		香取	5.8	3.1	6.8	
		安房	4.8	4.6	5.8	
	シラホシカメムシ類	千葉	0.0	－	1.0	
		香取	0.0	－	0.0	
		安房	1.0	－	1.0	
	イネカメムシ	千葉	102.4	160.5	406.5	
		香取	188.7	120.0	382.3	
		安房	165.5	146.1	230.3	
	ミナミアオカメムシ	千葉	10.3	28.4	85.2	
		香取	2.9	0.9	2.9	
		安房	447.1	118.2	137.4	
	アカヒゲホソミドリカスミカメ	千葉	6.2	11.7	0.0	
		香取	13.5	7.5	19.4	
		安房	24.2	34.9	18.4	
	アカスジカスミカメ	千葉	56.9	170.6	91.9	
		香取	28.1	22.0	17.4	
		安房	183.9	214.2	93.9	
性フェロモン	ドウガネブイブイ	印旛、香取	0.93	1.81	1.51	頭/日
	ヒメコガネ	印旛、香取	3.40	12.14	3.44	
	コナガ	海匝	0.09	0.28	0.10	
	ハスモンヨトウ	県内全域	5.15	12.79	15.52	
	シロイチモジヨトウ	県内全域	6.20	2.81	7.20	
	オオタバコガ	県内全域	2.95	3.05	4.10	
	タバコガ	県内全域	1.02	1.26	1.79	
	ナシヒメシンクイ	東葛飾、印旛	2.22	1.70	1.04	
	モモシンクイガ	東葛飾、印旛	0.01	0.01	0.01	
	チャハマキ	東葛飾、印旛	0.52	0.06	0.02	
	チャノコカクモンハマキ	東葛飾、印旛	1.04	0.46	0.73	
チャバネアオカメムシ集合フェロモン	チャバネアオカメムシ	県内全域	8.75	7.13	1.50	頭/日
	ツヤアオカメムシ	県内全域	0.04	0.08	0.06	
	クサギカメムシ	県内全域	0.07	0.10	0.02	
	マルボシヒラタヤドリバエ（天敵）	県内全域	0.07	0.11	0.07	

○気象予報


９月10日気象庁発表
関東甲信地方における向こう１か月間の確率（%）

要　　素	低い・少ない	平年並	高い・多い
気　　温	10	40	50
降 水 量	20	40	40
日照時間	40	30	30

出典：気象庁ホームページ

向こう１か月間の各気象要素の平年値
（９月12日～10月11日）

要　　素	千葉	銚子	館山
気　　温（℃）	21.9	21.9	21.9
降 水 量（mm）	232.1	269.4	250.4
日照時間（hr）	122.9	140.2	135.3



過去２か月の気象概況（アメダス千葉）

農薬は適正に使用しましょう。無登録農薬の使用はできません。

- 農薬は、農薬取締法に基づいて、使用できる農作物の種類、適用病害虫、希釈倍数、収穫前使用日数、総使用回数などが定められています。
- 登録番号のない薬剤は、農薬として使用できません。登録農薬には必ず登録番号が記載されています（記載例　農林水産省登録第〇〇〇号）。
- 農薬はラベルをよく読んで適正に使用しましょう。
- 飛散しないよう工夫して散布しましょう。
- 農薬を使用したら必ず記帳するようにしましょう。
- タンクやホースは洗いもれがないようきれいに洗っておきましょう。

・病害虫発生予察情報はインターネットでもご覧いただけます。
メールの配信サービスも実施しています（要事前登録）
https://www.pref.chiba.lg.jp/lab-nourin/nourin/boujo/

・次回の発行予定は令和８年１０月１５日です。
なお、注意報等の臨時情報は逐次発行されます。

・県内で栽培される主要な農作物に発生する病害虫や雑草を
防除するための指針が千葉県 HP で公開されています。
https://www.pref.chiba.lg.jp/annou/shokubo/bojoshishin.html

・薬剤の選定については、最新の農薬登録情報を確認してください。
https://pesticide.maff.go.jp/

問合せ先
千葉県農林総合研究センター病害虫防除課
〒266-0014　千葉市緑区大金沢町 180 番地 1
TEL 043(291)6077　FAX 043(226)9107
E-mail cafrc-bojo@mz.pref.chiba.lg.jp